

## Betegtájékoztató csontvelő vizsgálatról / szövettani mintavételről

**Tisztelt Asszonyom / Uram!**

Vérképzőszervi betegségének pontos megítéléséhez csontvelő vizsgálat elvégzése szükséges.

Ehhez a beavatkozáshoz az Ön írásos beleegyezése szükséges. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a jelen betegtájékoztatót és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a beavatkozást végző orvoshoz.

- Mi a csontvelő?** A csontvelő a fő vérképző szervünk, tulajdonképpen egy kocsonyás állagú anyag, amely több csontunkban, de egységes rendszerként foglal helyet.
- A beavatkozás célja és előnyei:** A beavatkozás diagnosztikus célt szolgál. A vérképzőszervi betegségek vizsgálata során sok elváltozás egyszerű vérvételből kimutatható. Bizonyos esetekben azonban nem tudjuk nélkülözni a csontvelő vizsgálatát. A levett minta *mikroszkópos* vizsgálata mellett *speciális laboratóriumi technikákkal* (pl. kromoszóma vizsgálat) olyan információkhoz juthatunk, melyek a **betegség pontos típusának meghatározásához és az alkalmazandó terápiás eljárás kiválasztásához elengedhetetlenek**. Amennyiben szövettani mintavételre is sor kerül, a kivett anyagból további lényeges ismeretekhez juthatunk a csontvelő elhelyezkedését és működését illetően.
- Hogyan történik a csontvelő vizsgálat?** A beavatkozást végző orvos, steril kesztyűben, a bőrfelület fertőtlenítése után, helyi érzéstelenítésben (lidocain) egy sternum tüvel átfúrja a mellcsont kérgi részét. Az érzéstelenítés miatt ez nem jár fájdalommal. Ezt követően egy fecskendővel kis mennyiségű vérrel kevert csontvelőt szippant ki, mely pillanatszerű kellemetlen érzést okoz. A tű eltávolítása után, steril fedőkötés felhelyezése történik, majd rövid pihenő után a beteg felkelhet, mozoghat. **A csontvelő vétel kapcsán szövődmény alig fordul elő, kockázata nem haladja meg az izomba (pl. farba) adott injekció kockázatát.**
- Hogy történik a szövettani mintavétel (crista biopszia) csontvelőből?** A beteg stabil oldalfekvésben fekszik. A beavatkozást végző orvos, steril kesztyűben, a bőrfelület fertőtlenítése után, helyi érzéstelenítésben (lidocain) mindegy 3 mm átmérőjű eszközt vezet be a csípőcsont belsejébe, ennek kapcsán kis szövethengert emel ki abból. A beavatkozás kb. egy percre tartó szakasza során a beteg fájdalmat érezhet, mert az érzéstelenítő a csont belsejében nem fejt ki hatását. A tű eltávolítása után, steril fedőkötés felhelyezése történik, a mintavételt követően rövid ágynyugalom ajánlatos, ha szükséges fájdalomcsillapítót adunk. **A beavatkozás helyén a későbbiekben ritkán vérzés, gyulladás alakulhat ki, ezek a tünetek azonban spontán, vagy egyszerű beavatkozás hatására megszűnnek.**
- A beavatkozást követően ágynyugalomra, pihenésre van szükség.** A fedőkötés egy nap múlva levehető.
- A beavatkozás várható időpontja:** .....

**7. A beavatkozást végző személy:**

neve: .....  
szakképesítése: .....  
beosztása: .....

Jelen betegtájékoztatót elolvastam, megértettem. A beavatkozással kapcsolatban, az írásbeli tájékoztatóban nem szereplő kérdéseimre a teljeskörű egyéniesített szóbeli tájékoztatást megkaptam, és további kérdéseim nincsenek.

Kérdéseim a következők:

.....  
.....  
.....

Tudomásul veszem, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, az előzőekben nem említett szövődmények, melyek a várható gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozás, jelen esetben történő elutasítására. A beavatkozás elmaradásával összefüggésbe hozható egészségkárosodásért, illetve az esetleg kedvezőtlen gyógyeredményért kezelő orvosaimat a felelősség alól felmentem. Jelen nyilatkozattal megerősítem, hogy a felajánlott beavatkozásba beleegyezem.

**Alulírott, kijelentem, hogy nincs/van tudomásom gyógyszerérzékenységről.**

**Az alábbi gyógyszerekre vagyok érzékeny:**

Budapest, .....

.....  
beteg neve (nyomtatott betűkkel)

.....  
beteg aláírása