

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat a hasfali sérv helyreállító műtétéhez

A hasfalon bármely műtét után a hegvonalba sérv alakulhat ki. A sérvtömlőbe cseplez vagy bélszakasz juthat, amely gyulladást, fájdalmat vagy az érintett bélszakasz elhalását okozhatja. Ennek megelőzésére végezzük a hasfali sérv helyreállító műtéteket

Az eljárás technikája: a műtétet intratrachealis altatásban végezzük. Műtéti előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, illetve a már alvó betegnél a húgyhólyagba katétert helyezünk fel. A korábbi hegvonalba, vagy a heg eltávolítása után a sérvtömlő tartalmát felszabadítjuk, és a hasüregbe visszahelyezzük. A sérvtömlő falát kiirtjuk. Ha a sérvtömlő a köldököt magába foglalta, a köldököt is eltávolítjuk. A hasfal erősebb rétegeinek felkeresése után a hasfalat több rétegben zárjuk. Amennyiben az anatómiai helyzet megkívánja a sérv rekonstrukció során, ún. „háló”-t helyezünk be. Általában szívódrain / műanyag csövet / helyezünk a sebbe, melyet a műtét után néhány nappal távolítunk el.

Az eljárás következményei:

A sebszétválás elkerülése céljából szoros kötést kap a beteg a műtét után, mely kényelmetlen lehet. Kórházból való távozás után sérvkötő használatát javasoljuk. .

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítőszerrel vagy az altatószerekkel szembeni túlérzékenységi reakció. Igen ritkán sérülhet a bél. Ezen kívül előre nem látható vérzések léphetnek fel. Ezek ellátása / amennyiben jól látható módon történik és a műtét során azonnal felismerésre kerül / a műtét során biztosított.

Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények: utóvérzés, bélműködési zavarok, hashártyagyulladás, izzadmány vagy vérömleny keletkezése, hasfali seb gyógyulási zavara, stb. Ezek a szövődmények ritkán fordulnak elő és ellátásuk gyógyszeres vagy újabb műtéti kezeléssel megoldható. Az alkalmazott véralvadásgátló kezelés ellenére ritkán előfordulhat trombózis és embólia/ véralvadék képződése miatti keringéselakadás /

Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: a hasfali sérv kiújulhat, hasüri összenövések miatti krónikus fájdalom, esetleg bélelzáródás . Ezek igen ritkán előforduló szövődmények

Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei:

A sérvtömlőbe cseplez vagy bélszakasz juthat, amely gyulladást, fájdalmat vagy az érintett bélszakasz elhalását okozhatja

Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Kerülje a nyers rostot tartalmazó és puffasztó ételek fogyasztását. Sebét tartsa tisztán és szárazon. Haskötő viselése javasolt. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok - nem járulok hozzá – a fenti beavatkozás elvégzéséhez.

Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak. Tudomásul vettem azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthetnek a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása

Budapest,

.....
A beteg olvasható aláírása

.....
vagy a törvényes képviselő olvasható aláírása