

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat a méhfüggelékeken végzett hasi műtétekhez

A méhfüggelékeken / petefészkek, petevezetők / végzett műtétek számos megbetegedésben indokoltak lehetnek. Ezek közül a leggyakoribbak: gyulladás, endometriosis, petefészkekcsizta, petevezető gyulladása, méhenkívüli terhesség. Amennyiben a betegség nagy méretű, nem egyértelmű a jóindulatúsága, vagy egyéb anatómiai okok indokolják, nyitott hasi műtétet végzünk.

Az eljárás technikája: a műtétet intratrachealis altatásban végezzük. Műtéti előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, illetve a már alvó betegnél a húgyhólyagba katétert helyezünk fel. Jóindulatú elváltozás esetén általában haránt metszést ejtünk „bikini” vonalban a hasfalon. Extrém méretű elváltozások esetén a köldök alatt középvonalon, vagy a köldök fölé is meghosszabbított hosszanti metszéstől hatolunk a hasüregbe. A műtét során az elváltozástól függően eltávolíthatjuk a kóros képletet / pl. ciszta / , az egyik vagy mindkét oldali petevezetővel, és egyik vagy mindkét oldali petefészkekkel együtt. A műtét során szervmegőrzésre és állománymegóvásra törekszünk, amennyiben a beteg még gyermeket szeretne és az elváltozás jóindulatú.

A vérzéscsillapítás után esetenként a hasüregbe draint / műanyag csövet, mely a műtéti területről a hasfal elé vezet ki / helyezünk be. Ennek eltávolítására néhány nappal a műtét után kerül sor.

Az eljárás következményei:

A műtéti következmények az alapbetegségtől és a műtét típusától függenek. Egyoldali petefészkek eltávolítás hormonális kiesést nem okoz. Mindkét oldali petefészkek eltávolítás hormonkiesési tüneteket okozhat, melyek azonban hormonpótló gyógyszerek adásával kivédhetőek. Fogamzóképes nőknél a teherbeesési esély változása / csökkenése vagy növekedése / szintén az alapbetegségtől és a műtét típusától függ.

Igen ritkán, váratlanul rosszindulatú elváltozást találunk a hasüregben. Ekkor a műtét kiterjesztését végezzük / méheltávolítás, petevezetők és petevezetők eltávolítása stb / , szem előtt tartva, hogy a beteg gyógyulása az elsősorú cél.

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítőszerekkel vagy az altatószerekkel szembeni túlérzékenységi reakció. Igen ritkán sérülhet a húgyhólyag, a húgyvezeték, a bél. Ezen kívül előre nem látható vérzések léphetnek fel a kismedence igen bő érellátású területeiről. Ezek ellátása / amennyiben jól látható módon történik és a műtét során azonnal felismerésre kerül / a műtét során biztosított.

Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények: utóvérzés, bélműködési zavarok, húgyúti fertőzés, hashártyagyulladás, izzadmány vagy vérömleny keletkezése a hasban vagy hasfalban, hasfali seb gyógyulási zavara, a bőrérzés zavarai, stb. Ezek a szövődmények igen ritkán fordulnak elő és ellátásuk gyógyszeres vagy újabb műtéti kezeléssel megoldható. Az alkalmazott véralvadást gátló kezelés ellenére ritkán előfordulhat trombózis és embólia/ véralvadáék képződése miatti keringéselakadás /

Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: hasfali sérv, hasüri összenövés miatti krónikus fájdalom, esetleg bélelzáródás, fistula / sipoly / képződés a vizeletelvezető rendszer és a hasüreg vagy a hüvely között. Ezek igen ritkán előforduló szövődmények

Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei:

A műtéti beavatkozás elmaradásának esetleges veszélyei betegségekhez / függően

- gyulladás esetén a folyamat továbbterjedése, egész hasüregre terjedő hashártyagyulladás
- endometriosis esetén: meddőség, fájdalom, kismencedei összenövések, petefészekciszta
- petefészekciszta esetén a ciszta csavarodása vagy megrepedése miatt hashártyagyulladás
- krónikus petevezető gyulladás esetén a fogamzóképeség csökkenése, elvesztése
- rosszindulatú daganatok esetén : a daganat terjedése, mely életet veszélyeztető állapotot idéz elő

Általános életmódbeli javaslatok az otthoni lábadozás időszakára:

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Kerülje a nyers rostot tartalmazó és puffasztó ételek fogyasztását. Sebét tartsa tisztán és szárazon. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok - nem járulok hozzá – a fenti beavatkozás elvégzéséhez.

Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak. Tudomásul vettem azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthetnek a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása

Budapest,

.....
A beteg olvasható aláírása

.....
vagy a törvényes képviselő olvasható aláírása