

Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat a hüvelyi úton történő méheltávolítás végzéséhez

A méh hüvelyi úton történő eltávolítása különböző jóindulatú megbetegedésében lehet indokolt. Ezek közül a leggyakoribbak: a méh süllyedése, a méh előesése, myoma uteri / jóindulatú méhtest daganat /, visszatérő és gyógyszeres kezelésre nem reagáló vérzészavar, krónikus kismencedei fájdalom

Az eljárás technikája: a műtétet gerincérzéstelenítésben vagy intratrachealis altatásban végezzük. Műtéti előkészítésként a szeméremtest leborotválására, a bőr fertőtlenítésére kerül sor, illetve a húgyhólyagba katétert helyezünk fel. A műtét során a hüvely felől távolítjuk el a méhet. A műtét során az elváltozástól függően eltávolíthatjuk csak a méhet, vagy a méhet az egyik és/ vagy a másik oldali petevezetővel és petefészekkel együtt.

A vérzéscsillapítás után esetenként a hüvelybe draint / műanyag csövet, mely a műtéti területről a hasfal elé vezet ki / helyezünk be. Ennek eltávolítására néhány nappal a műtét után kerül sor. Amennyiben vizeletcsepegés vagy a hüvelyfal süllyedése ezt indokolja, a mellső és/ vagy a hátsó hüvelyfal plasztikáját is egyúttal elvégezzük.

Az eljárás előnyei és hátrányai a hasi méheltávolítással összehasonlítva:

Kisebbségi a műtéti megterhelés, nincsen a hasfalon sebzés, elkerülhető az altatás, gyorsabb a gyógyulás, nem kell számolni a hasfali seb gyógyulásának zavaraiival.

Hátránya, hogy a műtét során nincs alkalom a hasi szervek áttekintésére. Mérsékelten gyakoribb a műtét utáni fertőzés, mert a hüvelyben lévő baktériumok a műtéti területet fertőzhetik.

Az eljárás következményei:

A méheltávolítás miatt a jövőben menstruáció nem fog jelentkezni, terhesség nem fordulhat elő. Egyoldali petefészek eltávolítás hormonális kiesést nem okoz. Mindkét oldali petefészek eltávolítás hormonkiesési tüneteket okozhat, melyek azonban hormonpótló gyógyszerek adásával kivédhetőek. A méheltávolítás szexuális élethez, libidóhoz való kapcsolata még vitatott, az esetek többségében azonban nem igazolható semmiféle hátrányos következmény.

Az eljárás veszélyei és az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok:

Műtét alatti szövődmények: a fertőtlenítőszerekkel vagy az altatószerekkel szembeni túlérzékenységi reakció. Igen ritkán sérülhet a húgyhólyag, a húgyvezeték, a bél. Ezen kívül előre nem látható vérzések léphetnek fel a kismencede igen bő érellátású területeiről. Ezek ellátása / amennyiben jól látható módon történik és a műtét során azonnal felismerésre kerül / a műtét során biztosított. Igen ritkán, a fenti okok miatt a hasfal megnyitására kényszerülhetünk.

Műtét után korai időszakban jelentkező szövődmények: a spontán vizeleti funkció megváltozása, nehezítettség, utóvérzés, bélműködési zavarok, húgyúti fertőzés, hashártyagyulladás, izzadmány vagy vérömleny keletkezése a hüvelyconkban, a bőrérzés zavarai, lábmozgatási nehézségek stb. Ezek a szövődmények ritkán fordulnak elő és ellátásuk gyógyszeres vagy újabb műtéti kezeléssel megoldható. Az alkalmazott véralvadásgátló kezelés ellenére ritkán előfordulhat trombózis és embólia/ véralvadék képződése miatti keringéselakadás /

Műtét utáni késői időszakban jelentkező szövődmények: hasüri összenövés miatti krónikus fájdalom, esetleg bélelzáródás, fistula / sipoly / képződés a vizeletelvezető rendszer és a hasüreg vagy a hüvelyconk között. Ezek igen ritkán előforduló szövődmények

Ezen eljárás elmaradásának esetleges következményei:

A műtéti beavatkozás elmaradásának esetleges veszélyei betegségekétől függően

- a méh jóindulatú daganata /myoma/ esetén: fájdalom, vérszegénységet okozó vérzési zavar, a myoma elhalása, gyorsan növekvő myoma háttérében igen ritkán rosszindulatú daganat is lehet
- a méh süllyedése előesése esetén akaratlan vizeletvesztés, vizeletelakadás, húgyúti fertőzések, székrekedés, a méhnyak fekélye, vérzése, a hashártya húzódása miatti alhasi vagy deréktáji fájdalom

ÁLTALÁNOS ÉLETMÓDBELI JAVASLATOK AZ OTTHONI LÁBADOZÁS IDŐSZAKÁRA:

Kímélő életmód: kerülje a fizikailag megerőltető tevékenységeket, ülőfürdőt, házaséletet. Tampon használata abszolút ellenjavallt. Panaszok esetén jelentkezzen osztályunkon.

A fentiekkel kapcsolatos kérdéseim és az erre kapott válaszok:

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott:

Ezen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok - nem járulok hozzá – a fenti beavatkozás elvégzéséhez.

Jelen döntésemet akkor hoztam, amikor minden kérdésemre választ kaptam, így a szükséges adatok rendelkezésemre álltak. Tudomásul vettem azt is, hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthetnek a kivizsgálás során ez idáig fel nem derített betegségek, eltérések fennállása

X Budapest,

X

A beteg vagy a törvényes képviselő

.....

tanú

.....

orvos